

新疆木蓼属新种

杨 昌 友

SPECIES NOVA GENERIS ATRAPHAXIS L. (POLYGONACEAE) E XINJIANG

Yang Chang-you

额河木蓼 (新种)

Atraphaxis jrtyschensis C. Y. Yang et Y. L. Han, sp.
nov.

Frutex diffusus valde ramosus ad 1—1.3m altus, cortice fuscato-griseo longitudine irregulariter.fisso. Rami firmi glabri, ramulis apice spinescentibus, ochreae ad 5—5.5mm longae, tubulosae, albo-hyalinae, internodiis foliisque breviores. Folia linearia, saepe leviter curvata 15—30mm longa, 2—4mm lata, apice acuta basi gradatim attenuata, margine revoluta, utrinque concoloria viridula glabra, subtus costa prominula. Racemi laterales vel terminales 3—10cm longi, remoti, pedicelli tennes, glabri, 5—10mm longi, supra medium articulati, phylla perianthii 5, tria interiora ad 5mm longa 6mm lata subrotunda, erecta, medio viridula margine alba vel rosea, reticulato-venosa, duo exteriora quam interiora multo breviora, refle-

— — — — —
本文作者的工作单位: 新疆, 乌鲁木齐, 新疆八一农学院 (Xinjiang August. -1 Agricultural College, Urumqi, Xinjiang)

xa, stamina 8. Achenia ovata acuminata, triquetra, brunneola, nitida.

Xinjiang: Burqin Xian, in arenis mobilibus apud flumen (Ertix He), 28, V, 1972, C. Y. Yang No. 72083, 72084 (**Typus**, in Herb. Coll. Agric. Aug.—1 xinjiang conservatur).

Species *A. pungenti* (M. B.) Jaub. et Spach affinis, sed differt foliis linearibus (nec obovatis), uninervibus (nec retinervibus), in arenis mobilibus (nec declivitatibus lapidosis).

窄叶刺木蓼 (新变种)

***Atraphaxis spinosa* L. var. *angustifolia* C. Y. Yang et Y. L. Han, var. nov.**

A var. *spinosa* foliis lanceolatis (nec ovatis vel obovatis) 8—10mm longis 3—4mm latis apice acuminatis basi cuneatis.

Xinjiang: Burqin Xian, in arenis riparis, 28 V 1973, Yang Chang-you n° 730189 (**Typus**, XJA—IAC).

_____ . . . _____